

00009

テスト カンジヤサマ

テスト カンジヤサマ 様

お薬情報（1種類）

令和 7年 4月22日

1 頁

| NO | 薬剤名 効能・効果 | 色・形・記号 | 起 | 朝 | 昼 | 夕 | 寝 | 注意事項 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | タミフルカプセル 75 mg インフルエンザウイルスに感染した細胞からウイルスが遊離することを阻害することによりウイルスの増殖を抑えます。 通常、A型またはB型インフルエンザウイルス感染症の治療に用いられます。 |  | | | | | | 抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無または種類にかかわらず、インフルエンザにかかった時は、異常行動を発現した例が報告されています。異常行動による転落などの万が一の事故を防止するために以下の点について注意してください。 -異常行動（急に走り出す、徘徊するなど）の発現のおそれがあること。 -自宅において療養を行う場合、少なくとも発熱から2日間、保護者の方は転落などの事故に対する防止対策を行ってください。 なお転落などの事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発現することが多いこと、が知られています。 |

東京都文京区本駒込2-28-16

医療法人 オルカ医院

電話番号： 03-3946-0001

医師名： テスト 医師