

N0	薬剤名 効能・効果	色・形・記号	起	朝	昼	夕	寝	注意事項
1	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） この薬は漢方薬です。あなたの症状や体質に合わせて処方してあります。かぜの引き始めの悪寒、発熱、頭痛、項背部のこわばり、肩こりなどを和らげます。 頭、首、肩、胸部（乳房）などの痛みや炎症を和らげます。 じんましんのかゆみ、はれ、赤みを和らげます。 通常、比較的体力のある人の、炎症性あるいは疼痛性疾患の初期、慢性炎症性疾患の急性増悪期などに用いられます。			1包	1包	1包		1日3回毎食前に14日分 1日3回上記量（7.5g） 全42包
2	アダラートL錠10mg 心臓や血管が収縮する原因となるカルシウムイオンの細胞内への流入を抑制することで、冠血管を拡張し、全末梢血管抵抗を減少させ、抗高血圧作用と抗狭心症作用をあらわします。 通常、本態性および腎性の高血圧症や狭心症の治療に用いられます。			1		1		血圧が下がることにより、めまいやふらつきなどが起こることがありますので、高い所での作業や車の運転、危険を伴う機械の操作などには十分注意してください。 グレープフルーツジュースはこの薬の作用を強めることがありますので、同時に服用しないでください。
3	リンデロン-VG軟膏0.12% 炎症を抑える合成副腎皮質ホルモン剤（ステロイド）と抗菌作用のある抗生物質の配合剤で、皮膚のかゆみ、赤み、はれなどの症状を改善します。 通常、細菌感染をとともうか、そのおそれのある湿疹・皮膚炎や乾癬などの治療に用いられます。真菌などの感染による炎症には原則用いられません。また、治りが遅くなるおそれがあるので、皮膚潰瘍や重いやけど・凍傷には用いられません。							耳介に全5g
4	ランタス注ソロスター 300単位 ヒトインスリンのアナログ（アミノ酸配列が異なるインスリン）で、肝におけるグルコース産生を阻害したり、筋肉や脂肪組織へのグルコースの取り込みを促進して血糖値を下げます。通常、インスリン療法が適応となる糖尿病の治療に用いられます。							指示された食事療法・運動療法をきちんと守ってください。 食事を摂らなかつたり、激しい運動をすると、低血糖を起しやすく、低血糖が続くと死亡事故につながることがあります。低血糖の予防と処置法（症状がみられたら直ちに砂糖、ジュースなどを補給する）に十分注意し、必ず家族やまわりの方に知らせておいてください。