

NO		薬剤名	効能・効果	色・形・記号	起	朝	昼	夕	寝	注意事項
1		アダラートL錠10mg	心臓や血管が収縮する原因となるカルシウムイオンの細胞内への流入を抑制することで、冠血管を拡張し、全末梢血管抵抗を減少させ、抗高血圧作用と抗狭心症作用をあらわします。 通常、本態性および腎性の高血圧症や狭心症の治療に用いられます。			1		1		血圧が下がることにより、めまいやふらつきなどが起こることがありますので、高い所での作業や車の運転、危険を伴う機械の操作などには十分注意してください。 グレープフルーツジュースはこの薬の作用を強めることがありますので、同時に服用しないでください。
2		ロキソニン錠60mg	炎症に伴う腫れや痛みをやわらげ、熱を下げます。 通常、関節リウマチ・変形性関節症ほか手術後や外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎、急性上気道炎の解熱・鎮痛に用いられます。			1	1	1		1日2回朝夕食後に28日分 朝：1錠 夕：1錠 1日2回上記量 全56錠
3		ザジテン点眼液0.05% 3.45mg5mL	アレルギーによって出てくるヒスタミンなどの生体内物質の働きを抑え、目のかゆみ、充血などの症状を改善します。 通常、アレルギー性結膜炎の治療に用いられます。							全1瓶
4		ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm	痛みや炎症の原因となる物質（プロスタグランジン）の生合成を抑制し、痛みや炎症をやわらげます。 通常、変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎（テニス肘など）、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛があるときの鎮痛・消炎に用いられます。							腰部に貼付 全56枚