散剤薬剤の数量を用法とおりに印字する際の薬袋システム設定変更手順

1. 薬袋システム「ファーミット mini」を起動し、「F2 マスタ」ボタンを押下する

Pharmit ver3.7 mini	10 ALTER					_	
and James Cas	処	方 1	S ERS	r		E	デージの取得
開創日 2018/00	/@						通信開始 停止
 ● 名章を ● 氏名 >ジガナ ■ 課生日 		(7245.0-60	Ú.				1 3447 () () () () () () () () () () () () () (
	-2m	12	ел. 11 П.Т.	×			
10.07	-	莱剂情报莱袋デ	-9				and and a second
R - E	M PI &	R	el H	3	籍	11 -	NT FR
							#195 100
			_			-	ICES BH
							F2 77.9

2.「マスタ選択」画面から「用法 (Shift+F8)」ボタンを押下する

🥪 Pharmit ver3.7 mini [マスタ選択]			×
医院			
診療科(Shift + F3)		医院情報	
 秦剤			
薬剤(Shift + F7)	用法(Shift + F8)	剤形(Shift + F9)	
患者(Shift + F11)			
		終了 (F12)	

3. 「用法マスタ」画面から該当する用法を選択する

※下記の例は対象用法として「毎食後に1包ずつ服用」を選択する場合です。

😝 Pharmit ver3.7 mini [用法マスタ]				
任意検索	を含む用法			
用法コード	用法	印刷文字列		
001900074	使用時、1/2(半分)使用	使用時、1/2(半分)使用してください		
001900075	すぐに飲んで下さい	すぐに飲んで下さい		
001900076	1日両眼6回	1日両眼6回お使い下さい		
001900077	1日両眼 回塗布	1日両眼 回塗布してください		
001900078	めまい時	めまい時にお使いください		
001900079	腰痛時	腰痛時にお使いください		
001900080	関節痛時	関節痛時にお使いください		
001900081	片頭痛時	片頭痛時にお飲みください		
001900082	1錠を半分に割ってからお飲み下さい。	1錠を半分に割ってからお飲み下さい。		
001900083	毎食後に1包ずつ服用	毎食後に1包ずつ服用してください		
001900084	朝堂」己、グ2己。毋良1街に	朝皇王己、ダン己。毋良復にの臥めください		
001900085	朝夕2包、昼1包。毎食後に	朝夕2包、昼1包。毎食後にお飲みください		
001900086	毎食後に2包ずつ服用	毎食後に2包ずつ服用してください		
001900087	朝昼2包、夕3包。毎食後に	朝昼2包、夕3包。毎食後にお飲みください		
001900088	朝夕3包、昼2包。毎食後に	朝夕3包、昼2包。毎食後にお飲みください		
001900089	毎食後に3包ずつ服用	毎食後に3包ずつ服用してください		
001900090	朝昼3包、夕4包。毎食後に	朝昼3包、夕4包。毎食後にお飲みください		
001900091	38.5以上で	38.5以上でお使い下さい		
001900092	6時間あけて	6時間あけてお使い下さい		
F2.追加	F3.削除 F4.修正 F5.E	见刷		

※該当用法が見つかったら、用法を<ダブルクリック>します。

4. 服用方法を用法の値に即した数値を入力し用法コードを入力し「F2 登録」ボタンを押下する

😽 Pharmit ver	3.7 mini [用法詳細]	×
用法コード	001900083	
用法名称	毎食後に1包ずつ服用	
薬袋印刷用1	行目 毎食後に1包ずつ服用してください	
薬袋印刷用2	行目	
種別	0 - <i>t</i> aL ▼	
分服数		
	分服 縦分割変換	
起		
朝		
昼		
タ		
寝		
随		
F2. 登録		F12. キャンセル
😽 Pharmit ver	- 3.7 mini [用法詳細]	
Pharmit ver 用法コード	3.7 mini [用法詳細]	
■ Pharmit ver 用法コード 用法名称	3.7 mini [用法詳細] 001900083 毎食後に1包ずつ服用	X
Pharmit ver 用法コード 用法名称 業装印刷用1	- 3.7 mini [用法詳細] 001900083 毎食後に1包ずつ服用 行目 毎食後に1包ずつ服用してください	X
Pharmit ver 用法コード 用法名称 薬袋印刷用1 薬袋印刷用2	- 3.7 mini [用法詳細] 001900083 毎食後に1包ずつ服用 行目 毎食後に1包ずつ服用してください 行目	X
♥ Pharmit ver 用法コード 用法名称 薬袋印刷用1 薬袋印刷用2 種別	- 3.7 mini [用法詳細] ○01900083 毎食後に1包ずつ服用 行目 毎食後に1包ずつ服用してください 行目 ■	X
 Pharmit ver 用法コード 用法名称 菜袋印刷用1 菜袋印刷用2 種別 分服数 	- 3.7 mini [用法詳細] 001900083 (毎食後に1包ずつ服用 行目 (毎食後に1包ずつ服用してください) 行目 (0-なし)	X
 Pharmit ver 用法コード 用法名称 薬袋印刷用1 薬袋印刷用2 種別 分服数 		
 ♥ Pharmit ver 用法コード 用法名称 薬袋印刷用1 薬袋印刷用2 種別 分服数 起 		
 ➡ Pharmit ver 用法コード 用法名称 薬袋印刷用1 薬袋印刷用2 種別 分服数 起 朝 	- 3.7 mini [用法詳細] 001900083 毎食後に1包ずつ服用 行目 毎食後に1包ずつ服用してください う日 3 う服 縦分割変換 1 001900083 毎食後に1包ずつ服用	
 ➡ Pharmit ver 用法コード 用法名称 薬袋印刷用1 薬袋印刷用2 種別 分服数 起 朝 昼 		
 ♥ Pharmit ver 用法コード 用法名称 薬袋印刷用1 薬袋印刷用2 種別 分服数 起 朝 昼 夕 		
 ♥ Pharmit ver 用法コード 用法名称 薬袋印刷用1 薬袋印刷用2 種別 分服数 起 朝 昼 夕 寝 	3.7 mini [用法詳細] 001900083 毎食後に1包ずつ服用 行目 毎食後に1包ずつ服用してください 行目 0-なし 3 分服 縦分割変換 1 001900083 1 001900083 毎食後に1包ずつ服用してください 第 第 第 第 第 第 第 1 001900083 毎食後に1包ずつ服用 1 001900083 毎食後に1包ずつ服用 1 001900083 毎食後に1包ずつ服用 1 001900083 毎食後しこ1包ずつ服用 1 001900083 毎食後しこ1包ずつ服用 1 001900083 毎食後しこ1包ずつ服用	
 ♥ Pharmit ver 用法コード 用法名称 薬袋印刷用1 薬袋印刷用2 種別 分服数 起 朝 昼 夕 寝 随 		

5. 該当薬剤の剤形変更が完了したら、各画面を「終了」ボタンを押下し閉じる

👽 Pharmit ver3.7 mini [用法マスタ] 🛛 🛛 📉				
任意検索	を含む用法			
用法コード	用法	印刷文字列		
001900074	使用時、1/2(半分)使用	使用時、1/2(半分)使用してください		
001900075	すぐに飲んで下さい	すぐに飲んで下さい		
001900076	1日両眼6回	1日両眼6回お使い下さい		
001900077	1日両眼 回塗布	1日両眼 回塗布してください		
001900078	めまい時	めまい時にお使いください		
001900079	腰痛時	腰痛時にお使いください		
001900080	関節痛時	関節痛時にお使いください		
001900081	片頭痛時	片頭痛時にお飲みください		
001900082	1錠を半分に割ってからお飲み下さい。	1錠を半分に割ってからお飲み下さい。		
001900083	毎食後に1包ずつ服用	毎食後に1包ずつ服用してください		
001900084	朝昼1包、夕2包。毎食後に	朝昼1包、夕2包。毎食後にお飲みください		
001900085	朝夕2包、昼1包。毎食後に	朝夕2包、昼1包。毎食後にお飲みください		
001900086	毎食後に2包ずつ服用	毎食後に2包ずつ服用してください		
001900087	朝昼2包、夕3包。毎食後に	朝昼2包、夕3包。毎食後にお飲みください		
001900088	朝夕3包、昼2包。毎食後に	朝夕3包、昼2包。毎食後にお飲みください		
001900089	毎食後に3包ずつ服用	毎食後に3包ずつ服用してください		
001900090	朝昼3包、夕4包。毎食後に	朝昼3包、夕4包。毎食後にお飲みください		
001900091	38.5以上で	38.5以上でお使い下さい		
001900092	6時間あけて	6時間あけてお使い下さい ▼		
F2.追加	F3.削除 F4.修正 F5. 印			



以上